


環のヌミはタコト比べ、
少し粘膜がある。



死後と黒い色素腺の
点存在する。


腕、触腕を合わせて
10本。

輸卵管が丸まっているから、
Xスドある。


元は死後にも
動いていた。

眼珠の中に水晶体列
がハク質...


Sepia esculenta コウイカ




クサフグ
Takifugu niphobles



ホシゴ 3 *Halichoeres tenuispinis*



ホンベラ ベラ科
Halichoeres tehuispinis



全体的に共通している。
 (死んだら黒くかたまる)。


#71111
 Pterogobius
 elapoides

キエウセ

体長 10cm 程

ニギハヤヒ


目の付近は色刺激の



瞳は黒色で、目の縁は金色に付いている。ヒトの目には対する部分は緑色である。

Halichoeres paucilopetus


スズキ目 ハヤ科 キエウセ



アヤハセ


カシカ科

Pseudoblennius marmoratus




ホシハダ(セマダ)


Halichoeres tenuispinis



Microcanthus strigatus カシカサダイ




ホヤ



ホンベラ (セトベラ)


Halichoeres poecilopterus

体の背側、腹側に小棘あり。毒があるよ☆
(食べた人によると身はおいしいらしい)



Takifugu niphobles フグ目、フグ科
和名 クサフグ (草河豚)


有毒



よく釣れる

クサツツ


Takifugu niphobles



フサフサ *Takifugu niphobles* フグ科
日本のフグで最も普通に見られ、有毒。
青森以南の各地、朝鮮半島に分布。

カジカ科アハハ属 アヤアハハゼ : *Pseudoblennius marmoratus*

閉じている




橙色の模様が
出る

肛門から

突起が出ている

胸びれ	14
第1背びれ	10
2	19
腹びれ	2
尾びれ	16



ツナツク tabijugus niphibles